

CORTINARIUS VARIICOLOR (Pers.) Fr.



SYNONYMES

Agaricus variicolor Pers.
Cortinarius largiusculus Britzelm.
Phlegmacium variicolor (Pers.) Wunsche
Pholiota variicolor (Pers.) Kumm.

BIBLIOGRAPHIE

Bon, 1988, Champignons d'Europe occidentale : 208
Brandrud, Melot et al., 1991, Cortinarius : B 20
Breitenbach & Kränzlin, 2000, Champignons de Suisse, 5 : 246
Consiglio, D. Antonini & M. Antonini, Il genere Cortinarius in Italia : C173
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons de France et d'Europe : 1162
Kühner & Romagnesi, 1953, Flore analytique : 272
Malençon & Bertault, 1970, Flore des champignons supérieurs du Maroc, 1 : 523
Marchand, 1982, Champignons du Nord et du Midi, 7 : 684
Moëgne-Loccoz & Reumaux, 1994, Atlas des Cortinaires, VIII : Fiche 316
Moser, 1978, Kleine Kryptogamenflora (*Traduction française*) : 724
Reumaux & Moëgne-Loccoz, 1994, Atlas des Cortinaires, VIII : Fiche 316
Tartarat, 1988, Flore analytique des Cortinaires : 94

ICONOGRAPHIE

Bon, 1988, Champignons d'Europe occidentale : 209
Brandrud, Melot et al., 1994, Cortinarius : B 20
Breitenbach & Kränzlin, 2000, Champignons de Suisse, 5 : 246
Consiglio, D. Antonini & M. Antonini, Il genere Cortinarius in Italia : C175
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons de France et d'Europe : 1162
Dähncke, 1993, 1200 Pilze : 745
Marchand, 1982, Champ. Nord et Midi, 7 : 684
Moëgne-Loccoz & Reumaux, 1994, Atlas des Cortinaires, VI : Pl. 177

OBSERVATIONS

Espèce réagissant en jaune aux bases fortes, caractérisée par son chapeau à marge violacée et à sa forte odeur terreuse.

DESCRIPTION

Chapeau hémisphérique puis convexe-aplani, de 5 à 12 cm de diamètre, fibrilleux-vergeté, parfois un peu squamuleux au disque, viscidule mais vite sec, brun roux sur fond lilacin.

Marge d'un violet soutenu au moins au début.

Lames serrées, adnées à sinuées, lilas pâle puis gris argilé à cannelle, plus nettement violette vers la marge du chapeau.

Stipe de 5 - 8 x 1,5 - 2,5 cm, à base claviforme, robuste, ferme, sec, soyeux-fibrilleux, violet pâle puis brunissant dans le bas, cerné de lilas au sommet.

Voile violet mais vite pâlissant, ne laissant que peu de traces

Cortine blanc lilacin, assez abondante au début mais fugace.

Chair lilas pâle puis blanchâtre sauf au sommet du pied.

Réaction rapide, jaune profond aux bases fortes.

Saveur douce

Odeur terreuse, forte et immédiate.

Habitat sous les conifères de montagne, en terrain siliceux.

Spores amygdaliformes, moyennement verruqueuses, de 10 - 12 x 5,5 - 6,5 μ .

Cellules marginales cylindracées à clavées.

Basides tétrasporiques, de 30 - 40 x 8 - 10 μ .

Epicutis filamenteux, à hyphes de 4 - 6 μ de large, bouclées.

Hypoderme peu différencié.

Pigment jaune brun, abondant, épihyphique, zébrant.

MICROSCOPIE (R.G.)



Spores x 400 (dans KOH)



Spores x 1000 (dans KOH)