

# **INOCYBE ABJECTA** P. Karst.

Planche de Jean Vialard



## **SYNONYMES**

*Inocybe flocculosa* var. *abjecta* R. Heim

## **BIBLIOGRAPHIE**

- Alessio, 1980, *Inocybe - Iconographia Mycologica* (J. Bresadola) vol. 29, suppl. 3 : Tab. 73-1  
Bon, 1988, *Champignons d'Europe occidentale* : 238  
Bon, 1997, *Documents Mycologiques*, 108 : 21  
Courtecuisse & Duhem, 1994, *Guide des champignons de France et d'Europe* : 1042  
Kühner & Romagnesi, 1953, *Flore analytique* : 227  
Kuyper, 1986, *Revision of the genus Inocybe* : 120  
Lange, 1935, *Flora Agaricina Danica*, 2 (Réimp. 1994) : 417, 609  
Moser, 1978, *Kleine Kryptogamenflora* (Traduction française) : 627  
Reumaux, 1986, *Bulletin de la Fédération mycologique Dauphiné-Savoie*, 102 : 12  
Stangl, 1989, *Hoppea*, 46 : 84  
Stangl, 1992, *Bulletin de la Société mycologique de France*, 108-2 : (65)

## **ICONOGRAPHIE**

- Alessio, 1980, *Inocybe - Iconographia Mycologica* (J. Bresadola) vol. 29, suppl. 3 : Tab. 73-1  
Bon, 1988, *Champignons d'Europe occidentale* : 239  
Bon, 1997, *Documents Mycologiques*, 108 : Planche 1 D  
Bresadola, 1930 (Réimp. 1981), *Iconographia Mycologica* : Planche 721-2 (*sn. Inocybe hirsuta*)  
Cetto, 1989, *I Funghi dal vero*, 6 : 2312  
Courtecuisse & Duhem, 1994, *Guide des champignons de France et d'Europe* : 1042  
Lange, 1935, *Flora Agaricina Danica*, 2 (Réimp. 1994) : Tav. 101 B  
Stangl, 1989, *Hoppea*, 46 : Taf. 14-4

## OBSERVATIONS

Récoltée au col de Porte, dans une clairière, à 1200 m. d'altitude.

Petite espèce à chapeau de 2 à 3 cm de diamètre, fibrilleux, voilé de blanchâtre sur fond beige, à odeur spermatique et pied prumineux à l'extrême sommet seulement.

## DESCRIPTION

Chapeau de 2 à 3 cm de diamètre, subconique à subcampanulé, puis convexe et plan-convexe, obtusément mamelonné, orné d'un voile discal blanchâtre +/- fugace, glabrescent, roux fauvâtre à brun ocre terne, +/- excorié à partir du disque après disparition du voile.

Marge enroulée sur le stipe au début, lisse ou fibrilleuse, nettement plus claire, à cortine évidente.

Lames peu serrées, assez épaisses, subventrues, adnées, blanches au début puis brunâtres, brun ocracé. Arête fimbriée.

Stipe de 4 - 5 x 0,2 - 0,3 cm, coudé ou tortueux, non bulbeux, blanchâtre, parfois nuancé de rosâtre, entièrement fibrillo-laineux de blanc.

Chair banale, blanchâtre à ocracée.

Odeur faiblement spermatique.

Habitat sous feuillus herbeux, en bordure de chemins, dans les allées de parcs.

Spores amygdaliformes, à sommet conique ou ogival, parfois étirés-submamelonnées, de 8-10 x 4,5-5,5  $\mu$ .

Basides tétrasporiques.

Cystides muriquées, étroites, fusi-lagéniformes ou cylindracées, à paroi de 0,5 à 1  $\mu$ , incolores dans NH<sub>3</sub>.


Epicutis subtrichodermique, à hyphes terminales souvent clavées.

Caulocystides rares près de l'insertion des lames.

## MICROSCOPIE (R.G.)



Spores x 1000 (dans l'eau)



Cystides x 400 (dans le congo)



Hyphes de la cuticule x 1000 (dans l'eau salée)