

**INOCYBE GERANIODORA variété DEPAUPERATA J. Favre**



**BIBLIOGRAPHIE**

Bon, 1997, Documents Mycologiques, 105 : 27

Favre, 1960, Catalogue descriptif des champignons de la zone subalpine du parc national suisse : 462

Kuyper, 1986, A revision of the genus *Inocybe* in Europe : 37

**ICONOGRAPHIE**

Favre, 1960, Catalogue descriptif des champignons de la zone subalpine du parc national suisse : Planche II-3

**OBSERVATIONS**

Variété léiosporée acystidiée, différente du type par ses couleurs plus pâles, par l'odeur de geranium plus faible ou nulle, par son habitat subalpin ou planitaire sous conifères et par des spores plus petites.

## DESCRIPTION

Chapeau de 2 à 3 cm de diamètre, conique, plus ou moins squamuleux, à fibrillum un peu excorié ou à squamules relevées au centre qui se craquèle parfois, fauvâtre à crème ochracé ou brun roux pâle.

Lames assez minces, plutôt ventrues, blanches puis graduellement brun très foncé.

Arête fimbriée, floconneuse, blanche.

Stipe élancé, brun roussâtre clair, à surface fibreuse, grossièrement floconneux de blanc au sommet, plein, de 3 - 5 x 0,2 - 0,4 cm.

Chair +/- roussâtre dans le pied, blanche dans le chapeau.

Odeur nulle ou peu distincte à légèrement pélargoniée.

Habitat dans l'herbe, sous conifères (pins, mélèzes, épicéas).

Spores de 10 - 15 x 5,5 - 6,5  $\mu$ , à apicule hyalin difficile à observer, elliptiques à subamygdaliformes.

Poils marginaux abondants, cylindracées à +/- ventrues ou étranglées, parfois subcapités.

Basides tétrasporiques.


## MICROSCOPIE (R.G.)



Spores x 400 (dans l'eau)



Spores x 1000 (dans la potasse)



Poils marginaux x 400 (dans la potasse)



Poils marginaux x 1000 (dans la potasse)