

MELANOLEUCA SUBSTRICTIPES Kühner



BIBLIOGRAPHIE

- Bon, 1991, Les Tricholomes et ressemblants : 125
Breitenbach & Kränzlin, 1995, Champignons de Suisse, 3 : 306
Fontenia, Gottardi, Para, 2002, Rivista di Micologia : 45-1, p. 54
Jamoni, 2008, Funghi alpini : 456
Roux, 2006, Mille et un champignons : 387

ICONOGRAPHIE

- Breitenbach & Kränzlin, 1995, Champignons de Suisse, 3 : 306
Jamoni, 2008, Funghi alpini : 457
Roux, 2006, Mille et un champignons : 387

OBSERVATIONS

Grande espèce montagnarde à chapeau de couleur blanc ivoire, différente de *Melanoleuca subalpina* et de *Melanoleuca evenosa* par ses cystides fusiformes subulées, à col droit, presque en poil d'ortie et partiellement incrustées au sommet.

DESCRIPTION

Chapeau de 5 à 8 cm de diamètre, convexe au début puis pulviné à bossu et +/- étalé, amplement mamelonné, mat, hygrophane, vite craquelé à partir du disque, blanc terne à ivoire ou beige ocracé pâle.

Marge longtemps blanchâtre, aiguë, entière.

Lames blanches puis crème, à légers reflets rosâtres, émaginées puis subdécurrentes, serrées.

Stipe de 5 - 8 x 0,5 - 1 cm, cylindrique, subbulbeux ou bulbeux à la base, blanc crème à carné, lisse à faiblement rayé longitudinalement, non ou à peine poudré au sommet.

Chair blanchâtre, immuable.

Odeur farineuse herbacée.

Saveur aigre, herbacée.

Habitat dans les pelouses montagnardes, les prairies subalpines, jusqu'en zone alpine.

Spores elliptiques, finement verruqueuses, hyalines, guttulées, de 8 - 10 x 5 - 6 μ , bassement ponctuées à +/- cristulées ou subréticulées.

Sporée blanchâtre crème.



Cystides en poil d'ortie à col droit ou à peine conique, avec 1 ou 2 cloisons, de 25 - 40 x 3 - 5 x 1 - 2 μ .

Epicutis subtrichodermique, à hyphes larges de 2 à 4 μ , dispersées, parfois avec quelques dermatocystides.

MICROSCOPIE (R.G.)




Spores x 1000 (dans melzer)



Cystides x 400 (dans phloxine)



Cyste x 1000 (dans phloxine)



Cuticule x 100 (dans phloxine)