

MYCENA PELIANTHINA (Fr.) Quél.



Planche de Jean Vialard

AUTORITÉS

Fries, 1821, Systema Mycologicum, 1 : 112, Agaricus pelianthinus

Quélét, 1872, Mémoires de la Société d'Emulation de Montbéliard, 5 : 102, Mycena pelianthina

OBSERVATIONS

Espèce peu fréquente mais recensée plusieurs fois dans les hêtraies et les bois mixtes du Vercors
(col de la Croix Perrin - Gève - Vassieux, ...)

Espèce très proche de *Mycena pura* et de ses formes ou variétés par ses couleurs et son odeur de rave,
mais facile à distinguer sur le terrain par son habitat sous feuillus, souvent sous hêtres,
et par l'arête des lames bordée de brun pourpre.

BIBLIOGRAPHIE

Bon, 1977, Documents Mycologiques, 27-28 : 83

Bon, 1988, Champignons d'Europe : 180

Boudier, 1905-1910, Icones Mycologicae, 4 (Réimp. 1982) : planche 67

Breitenbach & Kränzlin, 1991, Champignons de Suisse, 3 : 352

Courtecuisse, 1986, Bulletin de la Fédération Mycologique Dauphiné-Savoie, 100 : 24

Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons de France et d'Europe : 600

Eyssartier & Roux, 2011, Le guide des champignons de France et d'Europe : 378

Kühner, 1938, Le genre *Mycena* : 446

Kühner & Romagnesi, 1953, Flore analytique : 105

Lange, 1935, Flora Agaricina Danica, 1 (Réimp. 1993) : 82, 282

Maas Geesteranus, 1992, *Mycenas of the Northern Hemisphere*, 2 : 405

Malençon & Bertault, 1970, Flore des champignons supérieurs du Maroc, 2 : 289

Robich, 1991, Rivista di Micologia, 34-2 : 105

Robich, 2003, *Mycena d'Europa* : 91

Roux, 2006, Mille et un champignons : 594

ICONOGRAPHIE

Bon, 1988, Champignons d'Europe : 181

Boudier, 1905-1910, Icones Mycologicae, 1 (Réimp. 1981) : planche 67

Breitenbach & Kränzlin, 1991, Champignons de Suisse, 3 : 352

Cetto, 1970, I Funghi dal vero, 1 : 123

Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons de France et d'Europe : 600

Eyssartier & Roux, 2011, Le guide des champignons de France et d'Europe : 378

Lange, 1935, Flora Agaricina Danica, 1 (Réimp. 1993) : Tav. 49 C

Robich, 2003, *Mycena d'Europa* : 93

Roux, 2006, Mille et un champignons : 594

DESCRIPTION

Chapeau de 2 à 5 cm de diamètre, convexe puis plan, fibrilleux radialement, submamelonné, hygrophane, beige à l'état sec, gris violacé lilacin par l'humidité.

Marge aiguë, striée par temps humide.

Lames purpuracées, larges et ventrues, adnées-émarginées ou décurrentes en filet.

Arête denticulée, pourpre noir.

Pied de 40 - 80 x 5 - 8 mm, subégal ou un peu atténué de bas en haut, souvent comprimé, beige nuancé de violet, creux, fibrilleux de brun pourpre, cassant.

Chair mince, blanchâtre à concolore suivant l'humidité.

Odeur raphanoïde.

Saveur douce.

Habitat sous feuillus, dans les hêtraies ou les forêts mixtes, sur litières de feuilles.

Spores pruniformes à elliptiques, lisses, amyloïdes, hyalines, guttulées, de 5 - 7 x 2 - 3 μ .

Sporée blanche.

Basides tétrasporiques, cylindriques clavées, bouclées.

Cheilocystides étroitement fusiformes à clavées.

Pleurocystides fusiformes.

Epicutis constitué d'hyphes parallèles, brunâtres, larges de 1,5 - 2,5 μ , bouclées.

MICROSCOPIE (R.G.)



Spores dans la phloxine



Cheilocystides x 400 (dans l'eau)



Cheilocystide x 1000 (dans l'eau)