

TRICHIA PERSIMILIS P. Karst.



BIBLIOGRAPHIE

Bersan, 1987, Rivista di Micologia, 30-1-2 : 74

M. Poulain, M. Meyer & J. Bozonnet, Les Myxomycètes, T.1 : 120

ICONOGRAPHIE

M. Poulain, M. Meyer & J. Bozonnet, Les Myxomycètes, T.2 : 158

OBSERVATIONS

Fructifications sessiles disposées en groupes compacts, à capillitium élastique, à spores crêtées en forme de réseau incomplet, à élatères libres terminés en pointe et ornés de 3 à 5 bandes spiralées.

DESCRIPTION

Sporocarpes groupés, subglobuleux, sessiles, de 0,5 à 1 mm de diamètre, jaune-orange à ocre orangé ou brun jaune.

Péridium simple, membraneux, brillant.

Pas de columelle.


Elatères épineux, de 4 à 6 μ de large, ornés de 3 à 5 bandes spiralées, à extrémités libres et pointes courtes.

Spores de 9 à 12 μ , crêtées-réticulées, ornées de crêtes épaisses disposées en forme de réseau incomplet à mailles cassées.

Sporée jaune ocracé à jaune orangé.

Habitat sur bois mort.


MICROSCOPIE (R.G.)



Elatères et spores x 400 (dans l'eau)



Elatères x 1000 (dans l'eau)



Spores x 1000 (dans le congo)