

TRICHIA VARIA (Pers. Ex Gmel.) Pers.



BIBLIOGRAPHIE

- Cetto, 1976, I Funghi dal vero, 2 : 842
Martin & Alexopoulos, 1969, The Myxomycètes : 164
M. Poulain, M. Meyer & J. Bozonnet, Les Myxomycètes, T.1 : 117

ICONOGRAPHIE

- Cetto, 1976, I Funghi dal vero, 2 : 842
Martin & Alexopoulos, 1969, The Myxomycètes : Plate XI, fig. 111
M. Poulain, M. Meyer & J. Bozonnet, Les Myxomycètes, T.2 : 146, 147

OBSERVATIONS

Fructifications généralement sessiles et agrégées, à capillitium élastique, à élatères libres terminés en pointe et portant 2 ou 3 spirales.

DESCRIPTION

Fructifications grégaires ou agrégées, typiquement sessiles, rarement stipitées, se présentant sous forme de sporanges, rarement de subplasmodiocarpes.

Plasmode blanc.

Sporanges globuleux, obovoïdes ou allongés, de 0,5 à 0,9 mm de large.

Péridium simple, membraneux, brun jaune ou jaune olivacé à ochracé, brillant.

Hypothalle étendu, corné, bien visible .

Pédoncule parfois présent, de 0,1 à 0,5 μ de haut et 0,3 μ de diamètre, brun sombre à noir, opaque.

Capillitium élastique, constitué d'élatères simples ou ramifiés, de 3 à 5 μ de diamètre, comportant 2 ou 3 spirales irrégulières et terminés en une pointe effilée de longueur égale à 2 fois le diamètre.

Pédoncule, lorsqu'il existe, court et noir.

Spores jaune pâle sous le microscope.

Sporée jaune à jaune orangé.

Habitat sur bois mort.

MICROSCOPIE (R.G.)



Capillitium et spores x 400



Capillitium et spores x 1000



capillitium x 1000



Spores x 1000