

TUBARIA HIEMALIS Romagn. ex Bon



SYNONYMES

Naucoria furfuracea sensu Romagnesi

BIBLIOGRAPHIE

- Bon, 1992, Documents Mycologiques, 84 : 58
Bon, 1988, Champignons d'Europe occidentale : 246
Bon & Trimbach, 1973, Documents Mycologiques, 8 : 6
Breitenbach & Kränzlin, 1995, Champignons de Suisse, 4 : 464
Courtecuisse & Duhem, 1995, Guide des champignons de France et d'Europe : 1236
Keizer & Arnolds, 1995, Persoonia 16-1 : 118 (*Commentaires*).
Kühner & Romagnesi, 1953, Flore analytique : p. 243, note 5 (*sn. Naucoria furfuracea sensu Romagnesi*)
Moser, 1968, Kleine Kryptogamenflora : 582

ICONOGRAPHIE

- Bon, 1988, Champignons d'Europe occidentale : 247
Breitenbach & Kränzlin, 1995, Champignons de Suisse, 4 : 464
Cetto, 1983, I Funghi dal vero, 4 : 1322
Courtecuisse & Duhem, 1995, Guide des champignons de France et d'Europe : 1236
Dähncke, 1993, 1200 Pilze : 638

OBSERVATIONS

Les cheilocystides nettement clavées-capitées, la dimension des spores (7 - 10 x 4 - 5 μ), la poussée hivernale et les hyphes du médiastre large de 10 à 15 μ , sont autant de caractères qui permettent d'identifier cette espèce

DESCRIPTION

Silhouette naucorioide.

Chapeau de 2 à 4 cm de diamètre, convexe à plan, très hygrophane, sublisse à furfuracé, lubrifié, brun rougeâtre à l'état imbu, brun rouillé à brun argillacé, pâlissant en séchant.

Marge finement striée, ornée de flocons fugaces chez les jeunes exemplaires (restes du voile partiel).

Lames largement adnées à subdécurrentes, moyennement serrées, de couleur vive, ocre fauvâtre.

Stipe de 2 - 5 x 0,3 - 0,5 cm, égal ou légèrement clavé vers la base, concolore au chapeau, subcortiné sous les lames, prumineux en haut, creux à la fin.

Anneau absent.

Chair mince, subconcolore, hygrophane, grise et fibrilleuse dans le pied,

Habitat sur débris ligneux ou débris végétaux.

Spores ellipsoïdes, lisses, obtuses au sommet, non dextrinoïdes, à parois minces, de 8 - 9 x 4 - 5 μ .

Basides tétrasporiques. De 20 - 30 x 5 - 7 μ .

Hyphes du médiastrate larges de 15 à 20 μ .

Cheilocystides nombreuses, clavées à capitées, à col flexueux, .

Epicutis peu différencié, filamenteux, à hyphes x 5 - 15 μ .

MICROSCOPIE (R.G.)



Spores x 400 (dans congo)



Spores x 1000 (dans congo)



Cheilocystides x 400



Cheilocystides x 1000



Cuticule x 400