

## VERPA BOHEMICA (Krombh.) Schröt.



### SYNONYMES

Morchella bohemica Krombh.  
Mitrophora bohemica (Krombh.) Gillet  
Ptychoverpa bohemica (Krombh.) Boud.

### BIBLIOGRAPHIE

Bon, 1988, Champignons d'Europe occidentale : 326 (sn. *Ptychoverpa bohemica*)  
Boudier, 1905-1910, Icones Mycologicae, 4 (Réimp. 1982) : planche 218  
Breitenbach et Kränzlin, 1981, Champignons de Suisse, 1 : 9 (sn. *Ptychoverpa bohemica*)  
Grelet, Réimp. 1979, Les Discomycètes de France : p.19 n° 26 (sn. *Ptychoverpa bohemica*)  
Gruaz, 1993, Bulletin de la Fédération Mycologique, 131 : 26 (sn. *Ptychoverpa bohemica*)  
Marchand, 1971, Champignons du nord et du midi, 1 : 93 (sn. *Ptychoverpa bohemica*)  
Medardi, 2006, Ascomiceti d'Italia : 302  
Moser, 1963, Kleine Kryptogamenflora, 2 A (traduction française) : 87 (sn. *Ptychoverpa bohemica*)  
Roux, 2006, Mille et un champignons : 1173 (sn. *Ptychoverpa bohemica*)

### ICONOGRAPHIE

Bon, 1988, Champignons d'Europe occidentale : 327 (sn. *Ptychoverpa bohemica*)  
Boudier, 1905-1910, Icones Mycologicae, 2 (Réimp. 1981) : planche 218  
Breitenbach et Kränzlin, 1981, Champignons de Suisse, 1 : 9 (sn. *Ptychoverpa bohemica*)  
Cetto, 1975, I Funghi dal vero, 2 : 807 (sub *Verpa*)  
Marchand, 1971, Champignons du nord et du midi, 1 : 93 (sn. *Ptychoverpa bohemica*)  
Medardi, 2006, Ascomiceti d'Italia : 302  
Roux, 2006, Mille et un champignons : 1173 (sn. *Ptychoverpa bohemica*)



## OBSERVATIONS

Grande espèce élancée, à chapeau ovoïde ou campanulé, ochracé ou fauve ochracé, couvert de verrues élevées, sinueuses, cérébriformes et à pied allongé et pâle

Les verpes se différencient des morilles et des mitrophores par un chapeau entièrement libre, le point d'attache sur le pied étant uniquement sommital.

## DESCRIPTION

Fructifications de 4 à 15 cm de haut.

Chapeau campanulé à cylindrique, de 2 à 5 cm de haut, irrégulièrement ridé, morchelliforme, à côtes longitudinales proéminentes, subalvéolé, brun jaunâtre à brun foncé.

Marge blanche chez les jeunes exemplaires.

Surface interne lisse et blanchâtre.

Pied de 2 - 15 x 1 - 3 cm, cylindrique, élancé, plein puis creux, libre jusqu'au sommet du chapeau, blanc puis jaune ochracé, marqué de délicates bandes transversales feutrées-floconneuses.

Chair fragile, aqueuse, blanche puis jaune ochracé.

Saveur douce

Odeur faible.


Habitat dans les bosquets de feuillus, le long des haies, d'Avril à Mai.

Spores lisses, ellipsoïdes à subcylindriques, légèrement arquées, hyalines, de 55 - 80 x 17 - 23  $\mu$ .

Asques bisporés, de 250 - 350 x 18 - 25  $\mu$ , non bleuissants dans le Melzer.

Paraphyses cylindriques, un peu ondulées, septées, de 5 à 8  $\mu$  de large, à peine renflées au sommet.

## MICROSCOPIE (R.G.)



Hyménium x 100 (dans congo)



Asque x 400 (dans congo)



Spores x 100 (dans congo)



Spore x 400 (dans congo)



Paraphyses x 400 (dans congo)